

## SOMMAIRE DE L'INFORMATION - UXOR®

### Gel topique médicamenteux

#### RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

Le présent dépliant constitue la monographie de produit publiée par suite de l'homologation d'Uxor® pour la vente au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet du produit Uxor®. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

#### AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

##### Utilisation:

Aide à prévenir l'éjaculation précoce.

#### COMPOSITION

Voie d'administration	Forme posologique / dosage	Ingrédients actifs	Ingrédients non médicinaux :
Topique	Médicament (gel) topique. Tube de 56,8g.	Benzocaïne (Acide 4-aminobenzoïque, Ester d'éthyle) 7.5%	Glycérine, macrogol 3350, Laurate de PEG-8, poly(éthylène glycol), Saccharinate de sodium, acide sorbique, eau

##### Les raisons d'utiliser ce médicament :

Uxor® est un gel médicamenteux appliqué de manière topique. Sa formule est composée de benzocaïne (7,5%). Uxor® est une solution appuyée par des études cliniques visant à traiter les hommes qui éjaculent de manière précoce.

##### Les effets de ce médicament :

Uxor permet une légère désensibilisation du corps pénien. Ce faisant, il permet à l'utilisateur de mieux gérer son niveau de contrôle et d'éjaculer de façon plus tardive.

#### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

##### Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

L'éjaculation précoce pourrait être attribuable à une maladie nécessitant une supervision médicale. Si ce produit ne procure aucun soulagement lorsqu'il est utilisé selon les instructions, cessez de l'utiliser et consultez un praticien de soins de santé.

**Contre-indications:**

Si les symptômes suivants apparaissent, cessez d'utiliser le produit et consultez un praticien de soins de santé : faiblesse, confusion, mal de tête, difficulté à respirer, pâleur ou coloration grise ou bleue de la peau. Ces symptômes pourraient être le signe d'une méthémoglobinémie, un trouble rare qui survient jusqu'à 2 heures après l'utilisation du produit.

**Effets indésirables connus:**

Une hypersensibilité/allergie peut se manifester. Si tel est le cas, cessez l'utilisation.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

Il n'y a pas d'interactions médicamenteuses connues entre Uxor® appliqué de façon topique et les médicaments prescrits ou non prescrits. Comme pour beaucoup de questions médicales, vous devez contacter votre professionnel de la santé si vous avez des questions concernant votre état de santé. Si vous prenez ou songez à prendre des médicaments d'ordonnance, dites-le à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce produit.

**UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT****Posologie habituelle :**

Appliquez +/-2 grammes sur le gland et la veine dorsale du pénis, 5 à 10 minutes avant le rapport sexuel. Essuyez l'excédant avant de procéder à l'activité sexuelle.

**Surdose :**

Si vous appliquez une trop grande quantité du produit, simplement rincer avec de l'eau. Il est important de ne pas appliquer une trop grande quantité pour éviter qu'il ne s'introduise à l'intérieur de votre partenaire. Si vous ressentez des effets indésirables anormaux, non listés, consultez un médecin.

**DÉCLARATION D'EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS**

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé à notre centre de Pharmacovigilance Orimed par l'une des 3 façons suivantes :

Par courriel, à [pv@orimedpharma.ca](mailto:pv@orimedpharma.ca)

Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-399-9091

En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir :

— par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789, ou

— par la poste au : Programme Canada Vigilance

**REMARQUE**

Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, ou sur votre état de santé général, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.

**COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

Conservez à la température ambiante (15-30 °C).

Gardez hors de la portée des enfants. Cet emballage n'est pas à l'épreuve des enfants.

**POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

Si vous avez des questions ou des commentaires, si vous voulez obtenir ce document, d'autres renseignements sur le produit ou de la documentation préparée pour les professionnels de la santé, communiquez avec nous.

ENVOYEZ UN COURRIEL À :  
info@orimedpharma.ca

APPELEZ-NOUS AU :  
1.866.399.9091

ÉCRIVEZ-NOUS À :  
Orimed Pharma inc.  
203-1380, rue Newton,  
Boucherville (Québec)  
Canada. J4B 5H2

Pour plus d'informations, pour en connaître plus sur l'utilisation de ce produit et pour des nouveautés sur Uxor®, visitez le site internet, [www.uxor.ca](http://www.uxor.ca)

Orimed Pharma Inc, une division de Jamp Pharma Inc., a rédigé ce document.  
Dernière révision : Le 21 septembre 2015

**MO0004**  
**MO0004-E**